

Disturbi di interesse



Disturbi di interesse

Disturbi di salute mentale

Schizofrenia

La schizofrenia è un disturbo mentale grave che presenta un decorso cronico. Le persone affette da schizofrenia vivono in media 15-20 anni meno della popolazione generale, soprattutto per l'elevata comorbidità con malattie fisiche.



Disturbo bipolare

Il disturbo bipolare è una delle principali cause di disabilità a livello globale, e si associa con una precoce mortalità e una ridotta qualità della vita, anche a causa della comorbidità con malattie fisiche.

Depressione

La depressione è in assoluto la malattia che più contribuisce al carico di disabilità della popolazione mondiale; la sua presenza rende le persone più vulnerabili ad una serie di malattie fisiche, peggiorandone il decorso (es., il diabete).



Autismo

L'autismo è una malattia del neurosviluppo la cui prevalenza si attesta intorno al 2%. Le persone con autismo muoiono precocemente, spesso a causa dell'elevato carico di malattie fisiche croniche in comorbidità ad oggi ancora poco studiate, diagnosticate e curate.

Disturbi d'interesse

Disturbi fisici

Melanoma

Il melanoma è una malattia la cui morbilità e mortalità sono in drammatico aumento e, più frequentemente di altri tumori della pelle e altre condizioni dermatologiche, è associato a disturbi psichiatrici. L'associazione si traduce in una prognosi peggiore per entrambe le condizioni: la presenza di un disturbo mentale, in particolare se associato a deficit cognitivi, può compromettere l'accesso precoce e l'aderenza al trattamento del melanoma; al tempo stesso, la presenza di melanoma può precipitare i disturbi depressivi e d'ansia.




Psoriasi

La psoriasi è attualmente considerata una malattia sistemica a causa delle molteplici comorbidità ed è frequentemente associata a gravi disturbi mentali che non sono semplicemente una conseguenza del disagio dovuto a quella malattia: per la depressione, ad esempio, è stato dimostrato un ruolo causale nel peggioramento della psoriasi.

Ipoacusia

La perdita dell'udito colpisce circa 360 milioni di persone in tutto il mondo (più del 50% di quelle di età superiore ai 50 anni) e ha una frequente associazione con la depressione (soprattutto se è presente l'acufene) e la compromissione cognitiva che precedono la demenza, soprattutto negli anziani.



Artrosi



L'artrosi ha una prevalenza che aumenta con l'età ed è tra le sette condizioni di salute muscoloscheletrica che portano alla disabilità, in particolare negli anziani. La prevalenza della depressione è da 2 a 3 volte superiore nelle persone con artrosi rispetto alla popolazione generale. L'associazione tra tale condizione fisica e depressione si traduce in una maggiore disabilità funzionale e in un aumento dei costi per il trattamento.

Disturbi d'interesse

Disturbi fisici

Infezione da HIV

La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), causata dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV), colpisce 33,4 milioni di persone. L'AIDS si accompagna a disturbi psichiatrici in circa la metà dei casi, più frequentemente depressione, ansia, disturbi psicotici e compromissione cognitiva.



Epatite B

L'epatite virale ci pone attualmente di fronte alla sfida di identificare i pazienti positivi al virus ma inconsapevoli del loro stato clinico. I pazienti con gravi disturbi psichiatrici, dovuti a frequente deterioramento cognitivo, alterata cura di sé, uso frequente di sostanze illecite e attività sessuale non protetta, hanno un'alta probabilità di essere infettati senza esserne consapevoli.